

## Рекомендации по кормлению кур-несушек.

Чтобы избежать многих проблем, связанных с использованием в кормлении птицы кормов домашнего приготовления, лучше всего использовать готовые полнорационные комбикорма. **Полнорационные комбикорма** сбалансированы по протеину, жиру, клетчатке, макро-микроэлементам, витаминам, что позволяет получить мясо или яйцо с наименьшими денежными вложениями. Для птицы всех возрастных групп комбикорма выпускаются в виде крупки, оптимальной по размеру для поедания.

Для того, чтобы получить от куры-несушки максимальное количество яиц, необходимо правильно её вырастить, начиная с суточного цыплёнка. В связи с этим специалистами ЗАО «Новомосковский мелькомбинат» разработана линейка комбикормов. Начиная с суточного возраста и по 56-дневный возраст, можно использовать полнорационный комбикорм **ПК-2**. С 57 по 98 день необходимо осуществить переход с комбикорма ПК-2 на комбикорм **ПК-3** (заменять ПК-2 по 15% ежедневно на ПК-3). С 99 дня по 140 день следует использовать комбикорм **ПК-4**. В этот период необходимо обращать внимание на живую массу молодки и на формирование костяка, так как от его полноценности будет зависеть крепость скорлупы яйца в будущем. В период с 141 по 147-дневный возраст необходимо осуществить переход с комбикорма ПК-4 на комбикорм **ПК-1-2** (заменять по 15% ежедневно ПК-4 на ПК-1-2).

Кура-несушка в домашних условиях сносит своё первое яйцо в возрасте около 150 дней, при этом её рост и развитие не останавливается до 300-дневного возраста. При правильном кормлении и содержании продуктивность к 28 недельному возрасту достигнет пика (6-7 яиц в неделю). Далее живая масса куры-несушки должна оставаться постоянной и главное её не перекормить (110-130 грамм комбикорма на голову в сутки достаточно), т.к. избыток питательных веществ в рационе вызывает увеличение живой массы птицы за счёт отложения внутреннего жира, что в свою очередь ведёт к снижению продуктивности. На интенсивность яйценоскости большое влияние оказывает сезонность, но начиная примерно с 420-дневного возраста, интервал между снесёнными яйцами увеличивается. Это связано не с питательностью комбикорма, а с возрастными изменениями в организме птицы.

info@nmkhp.ru



www.nmkhp.ru

**ЗАО**  
**«НОВОМОСКОВСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ»**

# КОМБИКОРМ



**ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ**  
**ПТИЦЫ**

301652, Тульская область,  
г. Новомосковск, ул. Новая, д. 1

**(48762) 6-40-68**

**(48762) 6-43-93**

**(48762) 6-08-08**

**Примерные нормы скормливания птице полнорационного комбикорма (грамм на одну голову в сутки).**

Возраст птицы, нед.	Марка комбикорма	Норма, г/сутки	
		Белые	Коричневые
1	ПК-2	9	12
2	ПК-2	16	19
3	ПК-2	22	25
4	ПК-2	28	32
5	ПК-2	34	36
6	ПК-2	40	41
7	ПК-2	45	46
8	ПК-3	49	51
9	ПК-3	53	55
10	ПК-3	57	58
11	ПК-3	60	61
12	ПК-3	63	64
13	ПК-3	66	67
14	ПК-4	68	70
15	ПК-4	70	72
16	ПК-4	72	75
17	ПК-4	76	78
18	ПК-4	79	82
19	ПК-4	83	87
20	ПК-4	86	90
21	ПК-4	93	100
22	ПК-1-2	97	110
23	ПК-1-2	110	115
24	ПК-1-2	115	117
25-55	ПК-1-2	115	120

Нормы потребления комбикорма даны с учетом поддержания оптимальной для птицы температуры в помещении. При низкой температуре в помещении, где содержится птица, возрастает потребление корма.

**Обязательное условие в кормлении птицы:** в помещении или клетке, где содержится птица, постоянно должна быть поилка с чистой водой независимо от того, кормите ли Вы птицу комбикормом или кормосмесью собственного приготовления. Поилка должна быть хорошо освещена, особенно это касается содержания молодняка, т.к. к плохо освещенной поилке цыплята не подходят.

Кормить молодняк в первые две недели лучше сухими полнорационными комбикормами 5-6 раз в день, желательно в строго установленное время, затем до 8 недельного возраста 4 раза. Кур-несушек кормят 2 раза в день. Формирования яйца у птицы происходит ночью, поэтому желательно организовать вечернее кормление кур, чтобы основное количество кальция шло на образование скорлупы.

Нельзя допускать попадания влаги в корм и загрязнения корма. При кормлении сухим комбикормом отмечается хорошая поедаемость комбикорма, отсутствие грязи.

Для того, чтобы у яйца был яркий желток, необходимо летом добавлять траву, а зимой травяную муку. В зимний период нужно суточную норму комбикорма увеличить на 5-10% для поддержания температуры тела. Обязательно должен быть постоянный доступ к питьевой воде.

**ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМБИКОРМА:**

- корм полностью сбалансирован с учётом возрастных потребностей птицы;
- в корме присутствуют все необходимые минералы, витамины;
- высокая сохранность цыплят и их интенсивный рост;
- хорошее здоровье и продуктивность птицы;
- не нужно докармливать птицу овощами, зерном, добавками;
- исчезает необходимость смены рациона в разное время года;
- удобство применения и экономия места для хранения.